



CITRA Bors

B – 11,0 % (132 g/l), N – 4,5 %

Šķidrās mikromēslojums, kas izskauž bora nepietiekamību lauksaimniecības kultūrās. Ārpussakņu papildbarošanai.

PRIEKŠROCĪBAS

- regulē apputeksnēšanos
- regulē oglekļa un proteīnu metabolismu
- stimulē hormonu sintēzi
- uzlabo augu produktivitāti un ražas kvalitāti
- uzlabo imunitāti un izturību pret bakteriālajām slimībām
- pagarina uzglabāšanas ilgumu

Bora nepietiekamība noved pie:

- fenolu uzkrāšanās (toksiski vielmaiņas savienojumi)
- ģeneratīvo orgānu attīstības traucējumiem – samazinās ziedu un putekšņu daudzums, tie neattīstās
- pākstu un sēkļu daudzuma samazināšanās (rapsim), sakņu puves (dārzeni), lapu deformēšanās.

IĒPAKOJUMS: 10 l

Kultūra	Deva	Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Rapsis	1,0-1,5 l/ha	4-6 lapu stadija
		Veģetācijas atjaunošanās Ziedpumpuru stadija
Kukurūza	1,0 l/ha	7-10 lapu stadija
Pākšaugi	1,0-1,5 l/ha	Ziedpumpuru stadija
		Pupu nogatavošanās stadija
Graudaugi	0,5 l/ha	Karoglapas stadija
		Pirms vārpošanas
Ķirbji	1,0-1,5 l/ha	2-3 reizes veģetācijas periodā
Kartupeļi	1,0-1,5 l/ha	Ziedpumpuru stadija
Dārzeni	1,0-1,5 l/ha	2 nedēļas pēc asnu izdīgšanas
		2 reizes ik pēc 7-10 dienām

